

「遊離コルチゾール(非抱合型コルチゾール)」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、標記項目につきまして、検査内容を変更させていただきますので、取り急ぎご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目/変更内容

● 536 遊離コルチゾール(非抱合型コルチゾール)

変更内容	新	旧	備考
検査項目	尿中コルチゾール	遊離コルチゾール (非抱合型コルチゾール)	現行試薬の 販売中止
検査方法	CLIA	RIA 固相法	
検体量	畜尿 0.5mL	畜尿 2mL	
基準値	5.5~66.7 $\mu\text{g/day}$	11.2~80.3 $\mu\text{g/day}$	
備考	酸性蓄尿は不可。 非抱合型コルチゾールの測定 となります。	酸性蓄尿は不可。 トルエン 1~2mL を加え、 冷所に蓄尿し、よく混和し 所定量をご提出下さい。	


変更期日

● 令和4年3月31日(木)受付日分より

遊離コルチゾール (非抱合型コルチゾール)

現行試薬の販売中止に伴い、CLIA法試薬に変更いたします。新法では酸性蓄尿も検査可となります。
なお、新基準値は弊社従業員実測値にて設定した値です。

新旧二法の相関



(社内検討データ)

参考文献

関口昌江, 他: 医学と薬学 69 (6): 985-991, 2013.